

## ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิดโค กระบือ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิดโค กระบือ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“โรค” หมายความว่า โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)

“วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนโรคลัมปี สกิน ชนิดเชื้อเป็น ผลิตจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease - Neethling strain หรือ SIS Neethling - type ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

“สัตว์” หมายความว่า โค กระบือ

“ผู้ฉีดวัคซีน” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทย์สภาที่ร่วมปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่

“ท้องที่เกิดโรค (Infected zone)” หมายความว่า ท้องที่ภายในรัศมีห้าสิบกิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคหรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“ท้องที่เฝ้าระวังโรค (Surveillance zone)” หมายความว่า ท้องที่ที่อยู่นอกท้องที่เกิดโรคในรัศมีมากกว่าห้าสิบกิโลเมตรหรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายวัคซีน ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

(๑) ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรักษาคุณภาพวัคซีน

(๒) ให้ปศุสัตว์จังหวัดท้องที่เกิดโรคหรือท้องที่เฝ้าระวังโรคเบิกวัคซีนต่อผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วยแผนการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์ในท้องที่ โดยเสนอเรื่องผ่านปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุมัติ

(๓) เมื่อผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้อนุมัติแล้ว ให้ปศุสัตว์เขต เบิกวัคซีนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จำนวนทั้งหมดตามแผนการฉีดวัคซีน เพื่อนำไปจ่าย ให้กับปศุสัตว์จังหวัดตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ

(๔) ให้ปศุสัตว์เขต กำกับ ติดตาม สนับสนุน ร่วมปฏิบัติงาน และเมื่อได้ดำเนินการ ตามแผนการฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว ให้รายงานผลการฉีดวัคซีนให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบทันที

ข้อ ๕ ขั้นตอนการพิจารณาการใช้วัคซีน มีดังนี้

(๑) การดำเนินการก่อนการฉีดวัคซีน มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑.๑) ให้ผู้ฉีดวัคซีนหรือเจ้าหน้าที่ ชี้แจง ให้ความรู้ กับเจ้าของสัตว์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการฉีดวัคซีน การปฏิบัติกับสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และผลกระทบ ภายหลังได้รับวัคซีน รวมทั้งอาจมีการสูญเสียสัตว์อันเกิดจากผลข้างเคียงของการใช้วัคซีน

(๑.๒) ในการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ทุกราย

(๑.๓) ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ วัดอุณหภูมิตัวสัตว์ หากพบว่าสัตว์ตัวใดมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๙.๕ องศาเซลเซียส และมีอาการของโรคล้มปี่ สกีน ได้แก่ พบตุ่มเนื้องอกบนผิวหนัง เยื่อเมือกทั่วร่างกาย หรือตกสะเก็ดกลายเป็นแผลหลุม ให้งดการฉีดวัคซีน รวมทั้งสัตว์ร่วมฝูงด้วย และให้ทำการ กักสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย และควบคุมแมลงพาหะนำโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

(๑.๔) ให้ทำการควบคุมแมลงพาหะบนตัวสัตว์ด้วยสารเคมีกำจัดแมลงแบบหยดบนหลังสัตว์ (spot - on) หรือราดบนหลังสัตว์ (pour - on)

(๒) การดำเนินการฉีดวัคซีน ให้ผู้ฉีดวัคซีนปฏิบัติ ดังนี้

(๒.๑) ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่อยู่ในห้องที่เกิดโรค หรือห้องที่เฝ้าระวังโรค

(๒.๒) ฉีดวัคซีนในสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง

(๒.๓) ให้ฉีดวัคซีนในขนาดและวิธีการใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(๒.๔) กรณีสัตว์ตั้งท้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์

(๒.๕) ขวดวัคซีน เข็ม กระบอกฉีดยา และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการฉีดวัคซีนแล้ว ให้กำจัดตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

(๓) การดำเนินการหลังการฉีดวัคซีน มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑) ให้ทำสัญลักษณ์บนตัวสัตว์หรือเครื่องหมายประจำตัวสัตว์โดยการตีตราเป็น เป็นอักษรภาษาอังกฤษ “L” หรือ “X” บริเวณหัวไหล่ซ้าย หรือติดเบอร์หูพลาสติกตามที่กรมปศุสัตว์ กำหนด

(๓.๒) ให้ผู้ฉีดวัคซีนติดตามอาการข้างเคียงภายหลังจากฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา สามสัปดาห์ หากสัตว์แสดงอาการข้างเคียง ให้ดูแลรักษาตามอาการ

(๓.๓) ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หลังจากฉีดเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสัปดาห์

(๓.๔) เจ้าของสัตว์ต้องป้องกันหรือมีวิธีป้องกันแมลงดูดเลือดอย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งมีมาตรการในการลดประชากรแมลงดูดเลือดในบริเวณพื้นที่เลี้ยงโค กระบือ

(๓.๕) ห้ามส่งสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสัปดาห์

ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์